

Uwaga na korowódkę dębówkę - jak się chronić

11.6.2026 - | Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych

Grożne gąsienice korowódki dębówki, wcześniej zwalczane m.in. w Niemczech i Francji, pojawiły się już w Polsce. Owady te mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt, dlatego warto wiedzieć, jak ich unikać i co zrobić w razie kontaktu.

Korowódka dębówka to ciepłolubny motyl nocny. Rozpiętość jego szarych skrzydeł wynosi ok. 25 mm. Od późnego lata do jesieni samica składa około 150 jaj w górnej części korony dębu. Gąsienice wykluwają się jednak dopiero w maju.

Gatunek ten od lat występuje m.in. w Niemczech i Francji, gdzie jest zwalczany. Obecnie odnotowano jej obecność także w Polsce, w kilku regionach kraju. Można się spodziewać, że wraz z ocieplaniem klimatu i sprzyjającymi warunkami będzie pojawiać się coraz częściej, zwłaszcza w pobliżu dębów.

Dlaczego korowódka dębówka jest niebezpieczna

Największe zagrożenie stanowią gąsienice, pokryte mikroskopijnymi, trującymi włoskami (tzw. szczecinkami). Unoszą się one w powietrzu i mogą powodować:

- silne podrażnienia skóry i wysypkę,
- reakcje alergiczne,
- podrażnienia oczu,
- kaszel i problemy z oddychaniem.

Niebezpieczne są nie tylko same gąsienice, ale także ich gniazda oraz miejsca, w których przebywały – włoski mogą utrzymywać się w środowisku przez długi czas.

Jak rozpoznać korowódkę dębówkę

Pokryte gęstymi włoskami gąsienice żerują nocą, najczęściej na liściach dębów. Czasem można je spotkać na jesionach, bukach, kasztanach, brzozech, śliwach, leszczynach oraz wierzbach. Po zmroku przemieszczają się po pniach i gałęziach charakterystycznym korowodem. Stąd też ich nazwa - „korowódka dębówka”. Na jednym drzewie może być nawet 100 tys. takich owadów.

Jak się chronić przed korowódką dębówką

Aby ograniczyć ryzyko kontaktu:

- unikaj zbliżania się do gniazd i skupisk gąsienic,
- zachowuj ostrożność w pobliżu dębów, zwłaszcza latem,
- nie dotykaj gąsienic ani ich gniazd,
- pilnuj dzieci i zwierząt domowych.

Co zrobić po kontakcie z gąsienicą

W przypadku kontaktu ze szczecinkami korowódki:

- zdejmij ubranie i wypierz je w temperaturze min. 60°C,
- usuń włoski ze skóry np. przy pomocy taśmy klejącej – przyłóż klejącą stronę do miejsc, gdzie mogą znajdować się włoski gąsienicy i odklej. W razie konieczności czynność powtórz wielokrotnie, zmieniając kawałki taśmy.
- przemyj skórę letnią wodą,
- nie drap podrażnionych miejsc,
- w razie silnej reakcji alergicznej lub kontaktu z oczami – niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Wzrost zagrożenia a zmiana klimatu

Występowanie korowódki dębówki w Polsce wymaga czujności. Od ponad 10 lat obserwujemy jej namnażanie. Sprzyjają temu wysokie temperatury i suche dni na początku lata. Coraz częstsze nawałnice i silny wiatr mogą zdmuchiwać gąsienice i ich gniazda z drzew. Zwiększa to ryzyko kontaktu z parzącymi włoskami. Choć przypadki poparzenia przez korowódkę nie są częste, warto zachować ostrożność podczas korzystania z terenów leśnych i rekreacyjnych.

<https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/uwaga-na-korowodke-debowke-2013-jak-sie-chroni>
[c](#)