

Záchyt prioritného škodcu EÚ *Agrilus planipennis* (krasň jaseňový) počas prieskumu v roku 2026

14.7.2026 - | Ministerstvo podhospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky vykonáva na území Slovenskej republiky úradný prieskum výskytu prioritného škodcu Európskej únie *Agrilus planipennis* (krasň jaseňový) od roku 2016.

V roku 2026 bolo na monitorovanie škodcu použitých 12 feromónových lapačov. Počas kontroly lapača umiestneného v areáli **Vécseyho kaštiela v obci Streda nad Bodrogom, okres Trebišov**, bolo zachytených **18 dospelých jedincov** škodcu *Agrilus planipennis*.

Laboratórium ÚKSÚP potvrdilo identifikáciu škodcu dňa **3. júla 2026**. Zachytené exempláre boli súčasne zaslané do príslušného **Európskeho referenčného laboratória pre hmyz (EURL)** za účelom potvrdenia identifikácie.

Je potrebné uviesť, že Maďarsko informovalo Európsku komisiu o záchyte **jedného dospelého jedince *Agrilus planipennis*** v blízkosti ukrajinsko-maďarskej hranice dňa **24. júna 2026**, pričom išlo o prvý zaznamenaný záchyt tohto prioritného škodcu na území Európskej únie.

Krasň jaseňový pochádza z Ázie (Čína, Japonsko, Severná Kórea, Južná Kórea a Ruský Ďaleký východ) odkiaľ sa škodca rozšíril do Severnej Ameriky a Európy (európska časť Ruska, Bielorusko a Ukrajina). *A. planipennis* môže napadnúť a spôsobiť úhyn veľkých jaseňov, ako aj stromy a konáre s priemerom už od 1 cm. **Dospelé jedince *A. planipennis* sú dlhé 8,5 - 15,0 mm a široké 3,0 - 3,5 mm.** Telo je úzke, predĺžené, klinovitého tvaru a má kovovo modrozelenú farbu.

Hostiteľskými rastlinami škodcu sú:

V nadväznosti na záchyt bude monitorovacia sieť rozšírená o ďalšie **feromónové lapače**. Rozšírenie monitoringu je nevyhnutné vzhľadom na obdobie letu dospelých jedincov, ktoré prebieha od konca mája do začiatku septembra.

Súčasne bude v lokalite realizovaný intenzívny prieskum zameraný na:

Prieskum bude komplikovaný skutočnosťou, že škodca napáda predovšetkým vrchné časti koruny hostiteľských stromov. Podobné príznaky poškodenia spôsobuje na území Slovenskej republiky aj rozšírené hubové ochorenie jaseňa vyvolané patogénom *Hymenoscyphus fraxineus* (predtým *Chalara fraxinea*), ktorého symptómom je usychanie konárov vo vrchných častiach koruny.

V súčasnosti ide o záchyt dospelých jedincov v monitorovacom lapači. Výskyt škodcu na území Slovenskej republiky bude možné potvrdiť až po zistení ďalších dôkazov, najmä:

V prípade potvrdenia výskytu škodcu na území SR bude potrebné postupovať podľa **Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2024/434**, najmä:

zaviesť opatrenia na zákaz alebo obmedzenie premiestňovania hostiteľských rastlín, dreva a ďalších regulovaných predmetov.

<https://www.mpsr.sk/sk/index.php?id=20358&navID=1>