

El incendio de La Mierla deja más de 33.000 hectáreas quemadas

30.7.2026 - | SEO/BirdLife

Impacto severo e incertidumbre sobre la avifauna y los hábitats.

El fuego declarado el 16 de julio en la provincia de Guadalajara consigue estabilizarse tras arrasar una parte sustancial de la superficie protegida del Parque Natural y del Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA ES077, Sierra de Ayllón). Entre las especies amenazadas con mayor riesgo de impacto destacan grandes rapaces como el buitre negro, el águila real, el águila perdicera, el halcón peregrino, el buitre leonado o el alimoche común.

El incendio forestal iniciado el pasado 16 de julio en el término municipal de La Mierla (Guadalajara) – considerado el más grave de la historia de Castilla-La Mancha – ha logrado estabilizarse tras arrasar aproximadamente 33.000 hectáreas, el 95% de ellas dentro de la superficie del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

Desde SEO/BirdLife alertamos de que el alcance de este incendio tiene una magnitud sin precedentes que compromete gravemente la riqueza ecológica y ornitológica de la comarca.

Impacto severo e incertidumbre sobre la avifauna y los hábitats

Aunque aún se carece de información detallada del impacto concreto del fuego sobre los lugares de nidificación y campeo de estas aves, la afección se proyecta especialmente crítica sobre el **Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA ES077, Sierra de Ayllón)**, un espacio clave que alberga poblaciones de aves de elevado valor ecológico.

Atendiendo a la información de esta IBA, entre las especies amenazadas con mayor riesgo de impacto destacan grandes rapaces como el **buitre negro, el águila real, el águila perdicera, el halcón peregrino, el buitre leonado o el alimoche común.**

Al coincidir con el tramo final de la época reproductora, muchas de estas especies —junto a otras rapaces de ámbitos forestales como el **abejero europeo, el águila calzada, la culebrera europea, el milano real, el milano negro, el azor común o el gavilán común**— podrían haber contado con pollos aún vulnerables en sus nidos.

Otras especies de aves ligadas al bosque y al matorral del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara que también podrían ver mermada su población son la **alondra totovía, el alcaudón dorsirrojo, el roquero rojo, la collalba negra, el trepador azul, el carbonero garrapinos, el pico picapinos y el arrendajo euroasiático**. Asimismo, se ven expuestas la **paloma torcaz, la perdiz roja y la chocha perdiz**; esta última, de haberse visto afectada, supondría el menoscabo de

una de las poblaciones reproductoras más meridionales de la especie.

Subrayamos que el impacto real sobre cada especie dependerá de múltiples factores estructurales, entre los que se encuentran la intensidad del fuego (que en áreas leves permite un rápido rebrote del matorral), la existencia de «islas» no quemadas dentro del perímetro y la distancia a la que los ejemplares adultos se hayan visto forzados a desplazarse.

Con todo ello, insistimos en que las consecuencias exactas sobre la viabilidad de sus poblaciones no podrán determinarse con precisión hasta que se realicen los correspondientes censos de campo.

Foco en el origen y aumento del riesgo por el cambio climático

También hacemos un llamamiento a no invisibilizar el factor humano en las causas que motivan la aparición de incendios forestales en España, **ya que un tercio tienen su origen en negligencias e imprudencias graves** y más de la mitad son fuegos intencionados, como ya identificamos en nuestro [estudio sobre el origen y las motivaciones de la criminalidad ambiental](#). El porcentaje de incendios por causas naturales es muy pequeño, en torno al 5% de media.

Además, las circunstancias climáticas actuales favorecen la agresividad de los incendios: **la regla del 30-30-30**.

Esto quiero decir, que las altas temperaturas (más de 30º), la sequedad ambiental resultante de estas y de las escasas precipitaciones (menos de 30% de humedad ambiental) y los vientos extremos (a partir de 30 km/h empiezan a ser problemáticos) hacen que los incendios sean más difíciles de controlar, por lo que la prevención y extinción ha de adaptarse de manera urgente al escenario actual de cambio climático.

En este sentido, recordamos que cuando la AEMET identifica un riesgo alto o muy alto de incendio y las administraciones públicas fijan restricciones de uso o la prohibición de maquinaria, son una responsabilidad que hay que cumplir para proteger y conservar el patrimonio natural de todos.

Incendios activos

Seguimos la evolución de los incendios activos en España con especial atención a los de **Madrid, Ávila y Castellón** y al último de **Fermoselle (Zamora)** que de momento se ha conseguido estabilizar.

Así, mostramos nuestro apoyo a todas las personas afectadas y agradecemos el trabajo de los profesionales en las labores de extinción de los incendios, que están alcanzando unas dimensiones de gran impacto en espacios de alto valor ecológico.

Únete a la bandada. [Hazte socio/a](#) de SEO BirdLife y colabora con la conservación de las aves y la naturaleza.

<https://seo.org/incendio-la-mierla-30000-hectareas-quemadas>