

Bronchiolite du nourrisson : campagne de prévention 2026-2027

10.9.2026 - | ARS Centre-Val de Loire

Chaque année, à partir de l'automne et jusqu'à la fin de l'hiver, le virus respiratoire syncytial (VRS) circule activement, avec un pic habituellement observé en décembre. Il reste la première cause de bronchiolite chez le nourrisson et concerne près de 30% des nourrissons de moins de 2 ans.

La campagne 2026-2027 combine, comme les années précédentes, des mesures de prévention simples et des traitements préventifs efficaces pour éviter les formes graves de la maladie.

Les reflexes du quotidien pour freiner la transmission

Le VRS se transmet facilement par les gouttelettes et par contact. Quelques habitudes limitent sensiblement les risques :

- **Se laver les mains** avant et après chaque change, tétée, repas ou câlin ;
- **Aérer** régulièrement l'ensemble du logement ;
- **Porter un masque** en cas de rhume, toux ou fièvre, éviter le contact avec des personnes fébriles et ou enrhumées ;
- **Éviter** d'emmener son enfant dans **les lieux publics confinés, comme les supermarchés, les restaurants et les transports en commun**
- **Ne pas partager ses biberons**, tétines ou couverts non lavés ;
- **Ne pas fumer** à côté des bébés et des enfants.

Les traitements préventifs disponibles pour éviter les formes graves de la maladie

Deux stratégies alternatives permettent de protéger les nouveau-nés et les nourrissons.

La vaccination maternelle

Le vaccin **Abrysvo®** disponible depuis l'automne 2024, s'administre entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée (**huitième mois de grossesse**), en pharmacie ou en établissement de santé, à compter du **14 septembre 2026**.

Les anticorps produits par la mère traversent le placenta et protègent le bébé dès la naissance, pour une durée d'environ 6 mois.

Cette vaccination est intégralement prise en charge par l'Assurance Maladie pendant toute période de la campagne.

Les anticorps monoclonaux

Trois anticorps monoclonaux sont disponibles cette année : **Beyfortus®** et **Synagis®**, déjà utilisés les années précédentes, rejoints par un nouvel arrivant, **Enflonsia®**.

Administrables en maternité juste après la naissance ou en ville, ils s'adressent aux nourrissons abordant leur première saison d'exposition au VRS sauf si la mère a été vaccinée par Abrysvo® plus de 14 jours avant l'accouchement.

Beyfortus® (*nirsévimab*) mis à disposition en France depuis 2023

- **Public** : nouveau-nés, nourrissons lors de leur première saison d'exposition au VRS et enfants jusqu'à l'âge de 24 mois qui demeurent vulnérables à une infection sévère due au VRS lors de leur 2^{ème} année d'exposition au VRS.
- **Où** : en maternité, à la naissance, ou en ville
- **Prise en charge** : 100 % en établissement de santé ; 65 % en ville (contre 30 % les saisons précédentes).
- **Quand** : du 14 septembre 2026 au 28 février 2027, injection unique ; rattrapage possible pour les enfants nés entre le 21 février et le 13 septembre 2026.
- **Administration** : médecins, sages-femmes, infirmiers, ainsi qu'en PMI

Enflonsia® (*clesrovimab*) mis à disposition en France en 2026

- **Public** : nourrissons de moins d'un an, y compris les nouveau-nés lors de leur première saison d'exposition au VRS
- **Où** : en maternité, à la naissance, ou en ville
- **Prise en charge** : 100 % en établissement de santé ; 65 % en ville
- **Quand** : du 14 septembre 2026 au 28 février 2027, injection unique, sans adaptation au poids ; même rattrapage que pour Beyfortus®.
- **Administration** : médecins, sages-femmes, infirmiers, ainsi qu'en PMI

Synagis® (*palivizumab*)

- **Public** : réservé aux nourrissons à haut risque (prématurés, cardiopathies ou pathologies pulmonaires suivies en spécialité) jusqu'à l'âge de 24 mois.
- **Où** : uniquement en établissement de santé, sur avis spécialisé.
- **Schéma** : contrairement aux deux autres, une injection mensuelle pendant toute la période d'exposition au virus (et non une dose unique).

<https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/bronchiolite-du-nourrisson-campagne-de-prevention-2026-2027>