

# Zhoubný nádor má přes 342 tisíc klientů, skoro 8 tisíc z nich se léčí s nádorem hlavy a krku

12.5.2026 - Viktorie Plíková | Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

**S některým typem rakoviny se aktuálně léčí přes 342 tisíc klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Z toho téměř 8 tisíc z nich s nádorem hlavy a krku. Mohou postihnout rty, dutinu ústní, nos, vedlejší nosní dutiny, hltan, hrtan, slinné žlázy a místní lymfatickou tkáň.**

**Za vznikem onemocnění stojí často kouření včetně vapování a alkohol. Náklady na léčbu dosáhly loni bezmála 640 milionů korun. Tiskovou zprávy vydáváme při příležitosti Českého dne proti rakovině, který je letos věnovaný právě nádorům hlavy a krku a jejich prevenci.**

Nádory hlavy a krku je termín užívaný pro různorodou skupinu nádorů, jejichž původ je v ušní, nosní a krční oblasti. Jak uvádí Liga proti rakovině, nádory je možné rozdělit na nádory dutiny ústní, hltanu, nosohltanu, hrtanu, přechodu hltanu v jícen, dutiny nosní a velkých a malých slinných žláz.

Každý rok je ve světě diagnostikováno více než půl milionu nových případů tohoto onemocnění, čímž se v četnosti výskytu řadí na páté místo mezi zhoubnými nádory. V České republice patří naopak mezi nádory méně časté, nepřekračující 5 % z celkového počtu zhoubných nádorů. Nejvyšší výskyt nádorů hlavy a krku je ve věku 55 až 74 let. Nejčastěji jsou hlášeny nádory hrtanu a hltanu.

*„I když nízký počet může u někoho vyvolat pocit, že těmito typy nádorů je ohroženo jen malé množství lidí, i zde se ukazuje, že nejčastější příčinou vzniku tohoto typu vážného onemocnění je spojeno s nezdravým životním stylem. Konkrétně s kouřením, což platí i pro tzv. vapování, a také s nadměrným užíváním alkoholu. U mužů se nádory hlavy a krku vyskytují dvakrát více než u žen,“ říká **Miroslav Jankůj**, pověřený náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči, a dodává: „Celkové náklady na léčbu zhoubných nádorů byly vloni přes 25 miliard korun, z toho skoro 640 milionů korun šlo na terapii klientů s nádory krku a hlavy.“*

Vznik zhoubných nádorů v oblasti hlavy a krku je podmíněn celou řadou faktorů, z nichž nejčastější jsou vlivy životního stylu. Předpokládá se, že 80–90 % karcinomů je spojeno s chronickým užíváním tabáku (včetně žvýkacího), u mnohých pacientů v kombinaci s nadužíváním alkoholu.

*„Kombinace kouření a konzumace alkoholu výrazně zvyšuje riziko vzniku nádorového onemocnění. Dalšími predispozičními faktory jsou infekce lidským papilomavirem (HPV) a mnohem vzácněji virem Epstein-Barrové (EBV). Tyto nádory sice rychleji rostou, ale mají mnohem příznivější prognózu než nádory spojené s kouřením,“ říká **doc. MUDr. Radka Lohynská, Ph.D.**, přednostka Onkologické kliniky 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, a dodává: „Pro oblast hlavy a krku platí, že každý orgán má jiná rizika pro vznik nádoru. Například kouření nejčastěji vyvolává nádory hrtanu a dutiny ústní. Lidský papilomavirus způsobuje nádory krční mandle a kořene jazyka. Expozice ionizujícímu záření je spojena se zvýšeným rizikem vzniku nádorů štítné žlázy, sluneční UV záření může vyvolat karcinom kůže a rtu a expozice dřevnému prachu vznik nádorů nosní dutiny a paranasálních dutin. I dlouhodobé mechanické dráždění sliznice dutiny ústní, například protézami či ostrými okraji zubních výplní, a nedostatečná ústní hygiena mohou vést ke vzniku nádoru.“*

Nejdůležitější je všimnout si bulky na sliznici v ústech a krku nebo chrapotu včas, a pokud do 2–3

týdnů nezmizí, pak je vhodné neodkládat ORL vyšetření. Malé nádory se dají dobře léčit operací či zářením. U větších nádorů je pak nutná kombinace více metod léčby.

### **Některé možné příznaky nádoru krku:**

- Bolestivé nebo ztížené polykání, pocit cizího tělesa v krku, nehojící se vřidek v dutině ústní;
- Nově vzniklý chrapot nebo změna zabarvení hlasu, kašel trvající déle než dva týdny, ztížené dýchání, vykašlávání krve;
- Postupně se zvětšující, většinou nebolestivá rezistence (bulka) zevně na krku;
- Bolesti v uchu, přetrvávající výtok nebo krvácení z ucha, krvácení z nosu, oční poruchy, bolesti a uvolňování zubů.

**Žádný z těchto příznaků sám o sobě však nepotvrzuje diagnózu zhoubného nádoru.**

**Vždy je nutné navštívit lékaře v případě,** že se výše popsané příznaky vyskytnou, aby takové podezření vyloučil a určil pravou příčinu obtíží.

Z průzkumu, který si nechala VZP vypracovat, vyplývá, že jen 55 % Čechů ví, že screening je preventivní vyšetření k odhalení nemocí v časných a léčitelných stádiích. Některé ze screeningových vyšetření podstoupilo podle vlastní odpovědi pouze 30 % dotázaných. Z šetření dále vyplynulo, že se s nádorovým onemocněním v blízké rodině setkala celá polovina respondentů (52 %). Ti, kteří si takovou zkušenost nesou, jsou pak také ochotnější k návštěvě screeningového vyšetření.

*\*průzkum pro VZP ČR; agentura ppm factum research, s. r. o. (11/2024); 1 000 respondentů 18+*

VZP apeluje na všechny klientky a klienty ve věku nad 35 resp. 45 let, aby nezanedbávali prevenci a využili možnost **absolvovat screeningová vyšetření**.

**Viktorie Plívová**

tisková mluvčí

<https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/zhoubny-nador-ma-pres-342-tisic-klientu-skoro-8-tisic-z-nich-se-leci-s-nadorem-hlavy-a-krku>