

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 26. dubnu 2023

26.4.2023 - | Ministerstvo zemědělství ČR

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 16. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální.

Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k výraznému zlepšení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (9 %) se snížil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (28 %) se výrazně snížil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (47 %) se výrazně zvýšil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně rostla, u 26 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup a u 26 % vrtů velký vzestup hladiny. Pouze u 1 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 16. týdnu celkově mírně nadnormální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k výraznému zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (13 %) a podíl pramenů s normální vydatností (41 %) se snížil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (29 %) se výrazně zvýšil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně rostla, u 16 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení a u 26 % pramenů velké zvětšení vydatnosti. Pouze u 2 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení vydatnosti.

Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech byla v březnu mimořádně podnormální v podkrušnohorských pánvích (1A, 1B) a v části permokarbonu středních a západních Čech (8A, 8B) a severočeské křídý (skupina hg rajonů 4B). Silně podnormální byla hladina v části severočeské křídý (4C), jihočeských pánvích (2A), permokarbonu středních a západních Čech (8C), moravského terciéru (3C) a cenomanu severočeské křídý (6D). Silně a mimořádně nadnormální byla stále hladina také v části cenomanu severočeské křídý (6B a 6C), který má výrazně víceletý režim. V ostatních skupinách hg rajonů byla hladina normální. Oproti minulému měsíci se zlepšil stav části severočeské křídý (4A), cenomanu severočeské křídý (6E) a cenomanu východočeské křídý (7A). Zhoršil se naopak stav části východočeské křídý (5A) a moravského terciéru (3B, 3C). Zvýšil se zejména podíl objektů s mimořádně podnormální hladinou (21 %), snížil se naopak podíl objektů se silně nadnormální hladinou (2 % objektů). Dvě třetiny objektů zaznamenaly stagnaci až mírný vzestup hladiny (67 %), vzestup nebo velký vzestup hladiny pak 18 % objektů. Stagnaci až mírný pokles hladiny naopak zaznamenalo pouze 15 % objektů. V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se zhoršil stav hladiny v jihočeských a severočeských pánvích, zlepšil se naopak stav části hg rajonů ve východních Čechách (5A, 9A). Vzestup nebo velký vzestup zaznamenalo 11 % objektů, naopak pokles nebo velký pokles zaznamenalo 17 % objektů.

Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne většinou pozvolna klesaly, pouze některé přechodně místy kolísaly. Celkové rozdíly se nejčastěji pohybovaly od -10 do -50 cm, ale na některých tocích i více než -100 cm. V průběhu týdne postupně ubýval počet profilů, ve kterých byla překročena úroveň pro 1. či 2. SPA. Nejdéle 1. SPA setrvaly na Lužnici, dolní Vltavě, dolním Labi a Dyji. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky v širokém rozmezí od 50 do 300 %, ojediněle i vyšší (více než 4násobek Q_m). Toky s indikací hydrologického sucha se stále téměř nevyskytovaly.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované

odběry.

<https://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodni-zpravodajstvi/aktualni-informace-o-stavu-vodnich-16-3.html>