

Zaradi pojava influence pri konjih Uprava poziva k doslednem spoštovanju biovarnostnih ukrepov

30.4.2026 - | gov.si

Veterinarji so v zadnjem času zaznali pojave influence konj. Gre za zelo nalezljivo virusno bolezen, ki se hitro širi med konji, zato Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) lastnike in skrbnike konj poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov.

Virus se prenaša med konji z aerosolom (ki ga izločajo konji s kašljem) in direktnim kontaktom z izločki (nosni izcedek, izbljuvek). Prenaša se tudi prek oblačil in opreme oseb, ki delajo z okuženimi konji. Kljub previdnosti in ustrezni higieni se lahko hitro razširi med konji, ki si delijo bivalni prostor. Virus ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.

Influenca konj v zakonodaji EU ni uvrščena na seznam bolezni, za katere velja obvezno uradno obveščanje in nadzor na ravni države oziroma EU. Ne glede na to pa veterinarska zakonodaja s področja zdravja in zaščite živali jasno določa, da so vsi izvajalci dejavnosti (rejci oziroma lastniki živali) dolžni:

- spremljati zdravstveno stanje živali,
- ob pojavu kliničnih znakov bolezni nemudoma obvestiti veterinarja,
- izvajati ustrezne biovarnostne ukrepe,
- izvajati vse potrebne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni po pojavu bolezni (omejitev premikov, stikov, uporaba posebne obleke, obutve in opreme ipd.),
- zagotoviti primerno oskrbo obolelih živali ter
- ravnati skladno z navodili veterinarske stroke.

Biovarnostni ukrepi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja vnosa, prenosa in širjenja povzročiteljev okužb, z namenom zagotavljanja zdravja živali. S temi ukrepi lahko izvajalci dejavnosti (rejci) na najboljši možni način zaščitijo svoje živali pred boleznimi. Pomembno je zavedanje, da mora vsak rejec izvajati biovarnostne ukrepe, saj ima pojav bolezni pri enem rejcu neposreden vpliv na druge reje v sosedstvu ali širše.

Biovarnostni ukrepi pri influenci konj:

- karantena za novo nabavljene živali in takojšnja osamitev bolne živali s premestitvijo v drug prostor ali predel hleva, kjer je zmanjšan kontakt z ostalimi konji,
- redno čiščenje in razkuževanje hlevov, boksov, napajalnikov, opreme, prevoznih sredstev in drugo,
- pripomočki, kot so krtače, odeje, vrvi in druga oprema, se uporabljajo za vsakega konja ločeno,
- v času bolezni so premiki konj prepovedani, saj lahko udeležba na tekmovanjih, prireditvah ali premiki v drugo čredo povzročijo nenadzorovano širjenje bolezni v populaciji,
- osebna higiena (umivanje in razkuževanje rok), uporaba zaščitne obleke in obutve pri stiku z živalmi,
- upoštevanje osebne zaščite pri prehodih iz hleva v hlev (oskrbniki, kovači in drugi),

- preprečevanje vstopa nepooblaščenih oseb brez nadzora,
- higiena prostorov, kjer se nahajajo živali.

Redno cepljenje konj zmanjša verjetnost za nastanek bolezni. Cepljenje je predvsem pomembno za konje, ki se udeležujejo tekmovanj in drugih prireditev, kjer prihajajo v stik z drugimi konji. V primeru, da se bolezen vseeno pojavi, so bolezenski znaki pri cepljenih konjih bolj mili kot pri konjih, ki niso prejeli cepiva.

Več informacij je v obvestilu Veterinarske fakultete.

<https://www.gov.si/novice/2026-04-30-zaradi-pojava-influence-pri-konjih-uprava-poziva-k-doslednem-spostovanju-biovarnostnih-ukrepov>