

Bodnutí hmyzem poslalo vloni k lékaři přes 18 tisíc klientů VZP, meziročně méně

18.6.2026 - | Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

S bodnutím hmyzem se běžně setká téměř každý a ne vždy jde o banální záležitost. Běžnou reakcí je lokální otok, bolest, svědění a zarudnutí v místě vpichu, které během několika hodin odezní. Až u čtvrtiny lidí se však může objevit závažnější varianta, což je tzv. velká lokální reakce. Zde už otok přesahuje 10 cm a přetrvává déle než 24 hodin. K život ohrožujícímu anafylaktickému šoku mohou vést systémové alergické reakce.

Kvůli bodnutí hmyzem bylo v roce 2025 ošetřeno 18 520 klientů VZP, což představuje meziroční pokles o téměř desetinu. Nejčastěji lidé řešili reakce na bodnutí běžným hmyzem, jako jsou komáři, ovádi, blechy, štěnice nebo některé druhy mravenců. Těchto případů bylo více než 16 tisíc. Dalších zhruba 2100 klientů VZP vyhledalo ošetření kvůli bodnutí včelami, vosami nebo sršni.

„Lidé by neměli bodnutí hmyzem podceňovat. Zatímco většina reakcí je mírná, u některých pacientů se mohou objevit výrazné nebo i nebezpečné alergické projevy, které vyžadují rychlou pomoc. Z hlediska nákladů patří mezi nejnáročnější případy bodnutí vosami, včelami či sršni, kde se častěji objevují komplikovanější reakce vyžadující specializovanou péči. Celkové náklady spojené s bodnutím byly loni přes 18 milionů korun, oproti 20 milionům korun v roce 2024,“ říká **Miroslav Janků**, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči.

Počet pacientů ošetřených po bodnutí hmyzem a náklady na jejich léčbu

	2023		2024		2025					
	Počet klientů	Náklady v Kč	Počet klientů	Náklady v Kč	Počet klientů	Náklady v Kč				
Včely, vosy, sršně	2 211	4 827 220	2 729	5 777 667	2 144	4 788 312				
Celkem	16 167	15 259 429	20 475	19 895 012	18 520	18 493 182	Ostatní hmyz	13 956	10 811 480	17 14 117 16 13 704 746 346 376 870

Závažné reakce se u alergiků objevují zpravidla během prvních 15 minut po bodnutí hmyzem. Anafylaxe se může projevit dušností, otokem obličeje a hrdla, zrychleným či slabým pulzem, poklesem krevního tlaku, závratěmi, mdlobami, nevolností a zvracením; v nejtěžších případech může dojít až k oběhovému selhání a šoku, tedy tzv. anafylaktickému šoku. Závažnější průběh mívají také atopici. Vyšší riziko hrozí starším lidem se srdečními onemocněními nebo postižením průdušek.

Alergická reakce vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc, která zahrnuje podání adrenalinu i další podpůrná opatření. Mezi pomůcky, které mohou včasným podáním zachránit život v případě těžké alergické reakce, patří adrenalinová pera. Ta VZP hradí více než 17 767 svých klientů, o rok dříve se jednalo o 16 785 klientů. Jejich počet od roku 2014 stoupl více než 2,5krát.

[První pomoc a svépomoc](#) opatření pro alergiky po bodnutí hmyzem spočívají v tom, že pokud v místě vpichu zůstalo žihadlo, je nutné jej co nejrychleji odstranit. Aby se zabránilo vytlačení obsahu jedového váčku do rány, nemělo by se žihadlo svírat prsty ani pinzetou, ale opatrně jej odškrábnout

nehtem. V případě potřeby je třeba ihned použít pohotovostní léky. Otok lze zmírnit okamžitým zchlazením postiženého místa. Důležité je také zachovat klid a informovat lidi ve svém okolí o tom, že došlo k bodnutí hmyzem, a upozornit je na možné následky.

Viktorie Plívová

tisková mluvčí

<https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/bodnuti-hmyzem-poslalo-vloni-k-lekari-pres-18-tisic-klientu-vzp-m-ezirocne-mene>