

¡Es tiempo de flamencos!

17.9.2026 - | SEO/BirdLife

Tras concluir la etapa reproductora, las poblaciones de flamenco común inician intensos desplazamientos por la península ibérica y la cuenca mediterránea en busca de alimento y refugio estacional

Por su notable tamaño y su peculiar aspecto, el flamenco común resulta posiblemente la más espectacular de todas las aves acuáticas que pueblan nuestros humedales. Su estilizada silueta puede ser vista en muchos de los enclaves húmedos costeros mediterráneos y sur atlánticos, destacando el Delta del Ebro y Doñana, así como en ciertas lagunas del interior, como la malagueña de Fuente de Piedra —donde se asienta su principal colonia de cría en España y una de las más importantes de todo el Mediterráneo— o en diversas localidades manchegas.

Según los últimos censos de SEO/BirdLife realizados en 2021, **más de 20.000 parejas reproductoras de flamenco común eligen nuestro país para nidificar**, llegando incluso a alcanzar las 30.000 en años favorables 2017. Por otro lado, la población mundial de esta ave se ha estimado en 550.000-680.000 individuos reproductores (BirdLife International, 2024), de los cuales 71.800-265.000 nidificarían en Europa (BirdLife International, 2021); cifras que, pese a su abundancia global, no impiden que se considere una especie casi amenazada.

¿Por qué se mueven? El patrón tras la reproducción

Durante los meses de primavera y verano, las poblaciones de flamenco común permanecen concentradas en sus puntos de nidificación habituales, supeditadas al nivel de agua y a la disponibilidad de alimento para sacar adelante a sus pollos. Sin embargo, **una vez concluida la temporada de cría**, se activa un importante patrón dispersivo y migratorio.

El otoño y el final del invierno marcan las fases de mayor movilidad para la especie. Estos desplazamientos no siguen una ruta estrictamente lineal de norte a sur, sino que responden a una **dinámica nómada y metapoblacional** conectada por toda la cuenca del Mediterráneo y el noroeste de África.

Pareja de flamencos ©Shutterstock

Al secarse o reducirse las láminas de agua en las lagunas interiores tras el verano, **miles de ejemplares jóvenes y adultos se desplazan hacia humedales costeros, marismas y salinas** donde la disponibilidad de invertebrados acuáticos se mantiene estable.

De esta forma, **y gracias a la conectividad mediterránea**, un flamenco nacido en Doñana o Fuente de Piedra puede invernar en la Camarga francesa, las salinas de Cerdeña o los humedales del norte de África, y viceversa. Por su parte, los jóvenes nacidos durante el año aprovechan estos **meses otoñales** para explorar el territorio y asentarse en zonas de alimentación seguras antes de la siguiente temporada estival.

De los grandes humedales a las Reservas Ornitológicas de SEO/BirdLife

España cuenta con una red de humedales clave a nivel internacional para la supervivencia y paso estacional del flamenco común. Entre los puntos de mayor relevancia destacan: la **Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra (Málaga)**, como enclave neurálgico de cría; el **Parque Natural del Delta del Ebro (Tarragona)**, siendo el punto estratégico de alimentación e invernada; las **salinas de Santa Pola y Fondo de Elche (Alicante)** como zonas de acogida permanentes en el litoral levantino; y las **Marismas del Guadalquivir y Espacio Natural de Doñana (Huelva/Sevilla)**, espacio vital para el descanso y alimentación grupal.

Bando de flamencos en l'Abufer de Valencia ©Pablo Vera-SEO/BirdLife

No obstante, para disfrutar de la observación responsable y aprender sobre la conservación de estos ecosistemas, SEO/BirdLife cuenta con **dos centros clave en territorio peninsular**.

El primero de ellos es la **Reserva Natural de Riet Vell (Delta del Ebro)**. Ubicada en el corazón del Delta, esta reserva gestionada por SEO/BirdLife combina el cultivo ecológico de arroz con la restauración de hábitats marismenños y de carrizal. Es un mirador privilegiado para contemplar el paso de bandadas de flamencos y comprender el valor de la agricultura sostenible en la conservación de aves acuáticas.

El otro es el **Centro Ornitológico Francisco Bernis (El Rocío, Doñana)**. Situado a orillas de la marisma de El Rocío, este centro ofrece una vista panorámica directa a uno de los puntos con mayor concentración de avifauna de Europa. Desde sus ventanales y terrazas se puede observar cómodamente la actividad diaria de los flamencos y aprender sobre el estado de conservación de la marisma de Doñana.

La naturaleza en directo: Cámaras web de SEO/BirdLife

Para quienes deseen seguir el día a día de la avifauna en tiempo real o no puedan desplazarse sobre el terreno, SEO/BirdLife pone a disposición del público su red de **Cámaras en directo**.

A través de las transmisiones en vivo, es posible observar el comportamiento sin molestias de las aves acuáticas en el **Centro Francisco Bernis o Riet Vell**, así como en otros enclaves de alto valor ecológico de la red de espacios protegidos.

Únete a la bandada. Hazte socio/a de SEO BirdLife y colabora con la conservación de las aves y la naturaleza.

Únete a la bandada. Hazte socio/a de SEO BirdLife y colabora con la conservación de las aves y la naturaleza.

<https://seo.org/tiempo-de-flamencos>